


Arzin[®]

75 WG

A base de 75% de Métribuzine

- Un large spectre d'action contre les adventices graminées et dicotylédones.
- Une utilisation flexible : pendant ou après la levée de la culture.
- Agit via le système racinaire et foliaire.
- Formulation : micro granulés dispersibles (WG)



DESCRIPTION

ARZIN 75 WG est un herbicide sélectif à base de métribuzine, substance active de la famille des triazinones. Absorbé par les racines et les feuilles des adventices, il peut être utilisé aussi bien en pré-émergence qu'en post-émergence, du fait de son large spectre d'efficacité sur graminées et dicotylédones. ARZIN 75 WG est très soluble dans l'eau, ce qui rend le produit moins dépendant de l'humidité du sol et des précipitations. Sa rémanence est de l'ordre de 4 à 5 mois selon le type de sol et les doses d'emploi.

MODE D'ACTION

ARZIN 75 WG est caractérisé par son action qui consiste à l'inhibition de la photosynthèse et par conséquent le blocage du développement des mauvaises herbes. Il dispose d'une excellente action de contact sur les adventices levées ainsi qu'une bonne rémanence. Appliqué sur le sol, l'absorption de ARZIN 75 WG se fait par les racines des jeunes adventices, alors que s'il est appliqué sur les mauvaises herbes déjà levées, l'absorption se fait directement par le feuillage.

USAGES HOMOLOGUES

Cultures	Adventices	Doses	D.A.R
Pomme de terre	Adventices dicotylédones annuelles	1 Kg/ha	*
	Adventices graminées annuelles	1 Kg/ha	*

*Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus

MODE D'USAGE

ARZIN 75 WG est sélectif de la plupart des variétés de pomme de terre. Son utilisation est recommandée essentiellement en prélevée des pommes de terre et des adventices. Toutefois, son application en post-levée est également justifiée et doit être considérée comme une solution de rattrapage.

En prélevée, l'application se fera dans les 48 h qui suit le buttage définitif, en respectant les doses d'emploi recommandées. En post-levée, ne jamais dépasser le stade 5 cm de la pomme de terre. Dans le cas de rotation de cultures, il n'y a pas de risque pour la culture suivante dans un assolement normal. En cas de semis de salades ou de crucifères, faire précéder le semis d'un labour profond et s'assurer de l'absence de l'herbicide par des essais préalables.

NOS RECOMMANDATIONS

Avant toute application, s'assurer du bon état sanitaire des plants au moment de l'application, faire attention aux fortes pluies après l'application. Avant toute application en mélange avec d'autres spécialités phytosanitaires, veuillez contacter le département technique de la société.

